



Carbetocine (Duratocin^{MD})

(Agent utérotonique)

INDICATION :

- Agent utérotonique

PRÉSENTATION	Produit	Diluant	Concentration
	100 mcg/1 mL	Déjà dilué	100 mcg/mL

PRÉPARATION	Dose	Diluant	Volume final
BOLUS	100 mcg (1 mL)	9 mL NaCl 0,9%	10 mL

MÉDICAMENT DE NIVEAU D'ALERTE ÉLEVÉ : OUI

CONDITIONS POUR MÉDICAMENT DE NIVEAU D'ALERTE ÉLEVÉ (VOIR ANNEXE VI)

DV	DVP	BOLUS	♥	COMMENTAIRES
Double vérification indépendante	Double vérification programmation de la pompe	En moins de 10 minutes	Moniteur cardiaque	
OUI	-	MD*	NON OBLIGATOIRE	* Le personnel autorisé à la salle d'accouchement ou au bloc opératoire peut utiliser ce mode d'administration sous autre directive du médecin ou résident.

ADMINISTRATION :

• IV directe :	Diluer 100 mcg (1 mL) avec 9 mL NaCl 0,9% (Volume total 10 mL) Administer en au moins 1 minute.
• Autres voies d'administration possible :	IM

STABILITÉ pour préparation à l'unité de soins :

Fiole : Jeter portion inutilisée

Seringue : Préparer avant usage

COMPATIBILITÉ :

Solutés : NS, D5, LR

EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCE LORS DE L'ADMINISTRATION :

- Hypotension, tachycardie, douleur thoracique
- Bouffées vasomotrices, sueurs, frissons, prurit
- Céphalée, étourdissement, nausées vomissements