



**DEXTROSE 25% (Dextrose 25%<sup>MD</sup>)**  
(Agent hyperglycémiant)

**INDICATION ET DOSES :**

- Traitement de l'hypoglycémie : 0,5-1 g/kg (2-4 mL/kg), maximum 25 g/dose (100 mL)

**PRÉSENTATION ET RECONSTITUTION :**

Produit	Diluant	Concentration
Seringues pré-remplies ou fioles 25 g/50 mL	Déjà dilué	0,5 g/mL (50%)

**PRÉPARATION POUR ADMINISTRATION :**

- **IV directe**
  - Préparation d'une **solution-mère** de 25%

Présentation	Volume de médicament	Diluant supplémentaire	Volume final	Concentration finale
Seringue ou fiole 25 g/50 mL (50%)	25 g = 50 mL	50 mL NS	100 mL	0,25 g/mL (25%)

- Prélever le volume prescrit à partir de la solution-mère et administrer IV directe.

**STABILITÉ :**

Solution-mère : stable **1h TP**

**COMPATIBILITÉ SOLUTÉS PRIMAIRES :**

NS, ½NS, D5, D10, Mixtes, KCl

**EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCE :**

- Glycémie

**CONDITIONS POUR MÉDICAMENT DE NIVEAU D'ALERTE ÉLEVÉ :**

DVI	DVP	BOLUS	♥	COMMENTAIRES
Double vérification indépendante	Double vérification programmation de la pompe	En moins de 10 minutes	Monitoring cardiaque	
<b>OUI</b>	<b>N/A</b>	<b>OUI</b>	<b>NON</b>	<b>AUCUN</b>