



## Pantoprazole (PANTOLOC<sup>MD</sup>)

Inhibiteur de la pompe à protons

### INDICATIONS :

- Traitement des affections nécessitant une baisse rapide de la sécrétion d'acide gastrique (saignement gastro-intestinal)

| PRÉSENTATION | Produit       | Diluant  | Concentration finale |
|--------------|---------------|----------|----------------------|
|              | 40 mg / fiole | 10 mL NS | 4 mg / mL            |

| PRÉPARATION<br>DU SOLUTÉ | Dose                                                                     | Soluté                                                | Concentration finale |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
|                          | <u>Intermittent ou bolus initial</u> :<br>40 mg (10 mL)<br>80 mg (20 mL) | 50 mL NS ou D5%<br>100 mL NS ou D5%                   | 0,8 mg / mL          |
|                          | <u>Perfusion continue</u> :<br>40 mg (10mL)                              | 90 mL NS ou D5%<br>(100 mL duquel on a retiré 10 mL)  | 0,4 mg / mL (100 mL) |
|                          | <u>Perfusion continue</u> :<br>80 mg (20mL)                              | 180 mL NS ou D5%<br>(250 mL duquel on a retiré 70 mL) | 0,4 mg / mL (200 mL) |

### MÉDICAMENT DE NIVEAU D'ALERTE ÉLEVÉ : NON

### ADMINISTRATION :

|                                            |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • IV directe :                             | Peut être administré non redilué lentement (2 minutes).                                                                                |
| • Perfusion intermittente :                | Administrer 40 à 80 mg en 15 minutes.                                                                                                  |
| • Perfusion :                              | <u>Bolus initial</u> : Administrer 80 mg en 15 à 30 minutes.<br><u>Perfusion continue</u> : Administrer 20 mL/heure (pour 8 mg/heure). |
| • Autres voies d'administration possible : | Aucune                                                                                                                                 |

### STABILITÉ pour préparation à l'unité de soins

Fiole reconst. : Jeter portion inutilisée.

Soluté : 24h TP

### COMPATIBILITÉ

**Médicaments :** Insuline, vasopressine, épinéphrine, dimenhydrinate, furosémide, ceftriaxone.

**Solutés :** NS, D5%, LR, solutés avec potassium

**INCOMPATIBILITÉ :** Norépinéphrine, octréotide

### EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCE LORS DE L'ADMINISTRATION :

- Diarrhées, céphalées, somnolence, insomnie, vertige, tremblements, paresthésie, asthénie.

Août 2026