

Tableau - Date limite d'utilisation (DLU) des préparations pharmaceutiques

| Type de préparation | Présentation | Date limite d'utilisation MAXIMUM La date peut être réduite selon la date de péremption du fabricant ou des recommandations de la littérature |
|--|---|--|
| PRODUITS POUR USAGE ORAL | | |
| Comprimé, capsule intact | Reconditionné ou non en fiole de plastique (sauf emballage unidose) | 1 an après l'ouverture (conserver le dessiccateur dans le contenant d'origine) |
| | Emballage unidose | Date inscrite sur le sachet |
| Comprimé coupé | Contenant original, emballage unidose ou sachet multidose | 3 mois |
| Liquide préparé commercialement avec préservatif | Contenant original ou reconditionné en bouteille | 1 an après l'ouverture |
| Liquide reconstitué à la pharmacie | Contenant original ou reconditionné en bouteille | Selon les recommandations du fabricant ou maximum 14 jours |
| Préparation magistrale pour usage oral | Conditionnée en bouteille | Selon étiquette de la pharmacie |
| PRODUITS POUR USAGE TOPIQUE | | |
| Crème, onguent, gel préparé commercialement en <u>tube</u> | Contenant original | 1 an après l'ouverture Usage pour 1 seul patient |
| Crème, onguent, gel, liquide préparé commercialement en <u>pot</u> ou <u>bouteille</u> | Contenant original ou reconditionné dans un pot ou une bouteille | 3 mois après l'ouverture Usage pour 1 seul patient |
| Crème, onguent, gel, liquide préparé par la pharmacie (MAGISTRALE) | Conditionné dans un pot ou une bouteille | Selon étiquette de la pharmacie |
| Produit antiseptique | Contenant original | Information non disponible à la pharmacie |
| Solution pour irrigation sans préservatif (eau, NS, etc.) | Contenant original | 24 h à la température pièce après l'ouverture |
| PRODUITS TOPIQUES À USAGE OTO-OPHTALMIQUE | | |
| Produit oto-ophtalmique préparé commercialement | Contenant original | 1 mois après l'ouverture Usage pour 1 seul patient |
| Produit oto-ophtalmique préparé par la pharmacie (SCAS) | Conditionné dans une bouteille compte-goutte | Selon l'étiquette de la pharmacie Usage pour 1 seul patient |
| PRODUITS CHIMIQUES | | |
| Poudre de produit chimique qui sera utilisée pour préparation magistrale | Contenant original ou reconditionné | 1 an après l'ouverture |

****En tout temps, si les propriétés organoleptiques de la préparation changent, le produit ne devrait plus être utilisé.****

Références disponibles sur demande auprès du département de pharmacie.

| Type de préparation | Présentation | Date limite d'utilisation MAXIMUM La date peut être réduite selon la date de péremption du fabricant ou des recommandations de la littérature | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| PRODUITS STÉRILES POUR USAGE INJECTABLE | | Préparés à l'unité de soins | Préparés à la pharmacie (sous hotte stérile) | | |
| Produit commercial avec préservatif (fiolle multidose) | Contenant original déjà dilué, reconditionné ou reconstitué manuellement | 24 h Exception : insuline = 1 mois | 28 jours | | |
| Produit commercial sans préservatif (fiolle unidose) | Contenant original (fiolle ou ampoule déjà diluée), reconditionné | Usage unique | Fiolle = 24 h TP Ampoule = usage unique | | |
| Produit injectable (IV, SC, IM, ophtalmique injectable) préparé à la pharmacie | Conditionné en fiolle ou en seringue | Usage unique | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Individuel</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Lots</td> </tr> </table> | Individuel | Lots |
| | | | Individuel | Lots | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">48 h TP 14 jrs Frigo</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">30 h TP 9 jrs Frigo 45 jrs Congelé</td> </tr> </table> | 48 h TP 14 jrs Frigo | 30 h TP 9 jrs Frigo 45 jrs Congelé | | | |
| 48 h TP 14 jrs Frigo | 30 h TP 9 jrs Frigo 45 jrs Congelé | | | | |
| Soluté avec ou sans additif préparé commercialement | Soluté d'origine utilisé tel quel – aucune manipulation | Date de péremption du fabricant | Soluté pour préparation : 24 h Soluté pour APT : 48 h | | |
| Soluté préparé par la pharmacie (excepté périurale ou bloc) | Conditionné en sac | Usage unique – Ne pas réinstaller un produit qui a été retiré. | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Individuel</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Lots Solutés de bébé AA/Dextrose</td> </tr> </table> | Individuel | Lots Solutés de bébé AA/Dextrose |
| | | | Individuel | Lots Solutés de bébé AA/Dextrose | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">48 h TP 14 jrs frigo</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">30 h TP 9jrs Frigo 45 jrs Congelé</td> </tr> </table> | 48 h TP 14 jrs frigo | 30 h TP 9jrs Frigo 45 jrs Congelé | | | |
| 48 h TP 14 jrs frigo | 30 h TP 9jrs Frigo 45 jrs Congelé | | | | |
| Soluté préparé par la pharmacie pour périurale et bloc | Conditionné en sac | Ne pas préparer à l'unité de soins | 30 h TP 9 jrs Frigo | | |
| Soluté préparé à l'unité de soins | Un seul médicament ajouté au soluté de base | Usage immédiat – retirer après 24h | Non applicable | | |
| Sac de 50ml | Retrait de l'enveloppe Aucune manipulation | 15 jrs TP | 15 jrs TP | | |
| Sac de 100ml | Retrait de l'enveloppe Aucune manipulation | 30 jrs TP | 30 jrs TP | | |

DLU lors d'un changement de condition d'entreposage pour une préparation de produits stériles à faible risque. (réf. : Norme 2014.01 de l'OPQ, addenda 2017)

| Conditions d'entreposage | Explication / Exemple concret |
|--|--|
| Du congélateur à la température ambiante | <p>DLU de 48 heures à partir du début de la décongélation (sortie du congélateur) et ne pouvant dépasser la DLU initiale de 45 jours.</p> <p>Exemples:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Décongélation après 21 jours: nouvelle DLU dans 48 h (équivalent au jour 23 de la préparation). 2) Décongélation après 44 jours : nouvelle DLU dans 24 h (équivalent au jour 45 de la préparation, pour ne pas dépasser la DLU initiale). |
| Du congélateur au réfrigérateur | <p>DLU de 14 jours à partir du début de la décongélation/sortie du congélateur, et ne pouvant dépasser la DLU initiale de 45 jours.</p> <p>NB : Si la décongélation de la préparation stérile est effectuée temporairement à la température ambiante contrôlée avant d'être entreposée au réfrigérateur, utiliser alors la DLU applicable à la température ambiante contrôlée.</p> |
| Du réfrigérateur à la température ambiante | <p>DLU de 48 heures à partir de la sortie du réfrigérateur et ne pouvant dépasser la DLU initiale de 14 jours.</p> |