

ALGORITHME DÉCISIONNEL C. DIFFICILE (CLOSTRIDIODES DIFFICILE)

VOLET SOINS DE LONGUE DURÉE / SANTÉ MENTALE / RÉADAPTATION

A

SURVEILLANCE

1. Présence de selles liquides ou semi-liquides ≥ 3 / 24 heures
ET
2. Absence de cause connue et autres symptômes possibles (changement dans l'alimentation, intolérance alimentaire, nouveau médicament (antibiotique, laxatif), maladie intestinale, etc.

Possibilité de :

- Odeur para-crésol (crottin de cheval), fièvre, crampes abdominales, iléus, mucus ou glaires

B

INTERVENTION

Dès l'apparition de ces symptômes et après l'évaluation clinique

- Faire un dépistage COVID-19 (précautions aériennes contact avec protection oculaire)
- Évaluer les facteurs de risque : hospitalisation dans les 8 dernières semaines, antibiothérapie actuelle ou dans les 3 derniers mois, antécédent de diarrhée à *C.difficile*, âge de 65 ans et +, immunosuppression, chimiothérapie, maladie chronique, chirurgie digestive, prise d'inhibiteurs de pompe à protons
- Si le dépistage COVID-19 est négatif, instaurer les précautions additionnelles contact +
- Aviser le médecin, la conseillère en PCI et l'équipe de soins de l'unité
- Compléter la [grille de surveillance](#) (chaque quart de travail)
- Notes au dossier (évaluation clinique, interventions cliniques, évolution...)

C

PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES

- Affiche et port ÉPI : [CONTACT+](#)
- Port de la blouse à manches longues, des gants et hygiène des mains **OBLIGATOIRE AVEC EAU ET SAVON**
- Augmenter la fréquence de l'hygiène des mains des usagers idéalement avec **EAU ET SAVON**
- Si usager en chambre double : tirer le rideau. Le voisin de chambre n'est pas isolé.
- Changer la **literie et les vêtements quotidiennement**
- Chariot de lingerie souillée et de déchets idéalement dans la chambre
- Toilette ou chaise d'aisance dédiée avec enveloppe hygiénique
- Dédier les équipements de soins lorsque possible
- [Désinfecter les équipements de soins](#) après chaque utilisation avec des lingettes de produit **SPORICIDE** (ex. Clorox)
- Pour tout dégât ou souillure: nettoyer et désinfecter (jour-soir-nuit) le plus rapidement possible**
- Encadrer les usagers errants (hygiène des mains idéalement avec eau et savon, désinfection des surfaces *High Touch*...)
- Prévenir le risque de déconditionnement par :
 - o Mesures d'adaptation pour le bain/douche : **nettoyer et désinfecter le bain/douche après utilisation avec un produit SPORICIDE (Rescue) avec temps de contact de 10 minutes**
 - o Mesures d'adaptation pour la marche
 - o D'autres mesures d'adaptation personnalisées sont possibles après avis de l'équipe multidisciplinaire et de la PCI
- Enseignement aux visiteurs et proches aidants:
 - o Hygiène des mains avec eau et savon et port de l'équipement de protection individuel (ÉPI)
 - o Les inviter à consulter le [dépliant « Pratiques de base pour les visiteurs »](#)
 - o **Ne pas utiliser les toilettes de l'usager**

D

PRÉLÈVEMENT

- Résultat** : SI POSITIF aviser le médecin et se référer à l'algorithme « traitement de l'infection à *Clostridioides difficile* (*C. difficile*) » du CIUSSS, disponible sur [Intranet](#)
 - Maintenir les précautions additionnelles contact + en place
 - Aviser rapidement le gestionnaire, le médecin, la PCI et suivre les recommandations

E

DURÉE DE L'ISOLEMENT

- 72 heures après le retour des selles habituelles pour l'usager :
 - La durée pourrait être prolongée selon les recommandations de la PCI, l'évolution de l'état clinique de l'usager ou un diagnostic différentiel.

F

FIN DE L'ISOLEMENT

- Selon évaluation de la conseillère en PCI
- Aviser le service d'hygiène salubrité pour désinfection terminale de la chambre
- Nettoyer et désinfecter le matériel et les équipements de soins selon procédure