

Tableau résumé des multigermes en prévention des infections - HSCO

SARM			
	Précautions	Jumelage	Commentaires
Positif	«Contact»	PERMIS, quel que soit le(s) site(s).	<p>. Aussi appelé SARC à l'HSCO.</p> <p>. <u>À l'admission d'un usager connu porteur SARM :</u> Dépister le nez, les plaies présentant un écoulement, pourtour de stomie et l'urine chez les porteurs d'une sonde.</p> <p>. Requier 3 prélèvements pour chaque site connu à 7 jours d'intervalle sans ATB (anti-SARM tel que vancomycine iv, etc.) pour cesser l'alerte au dossier.</p>
	«Contact et Gouttelettes» si positif dans les expectorations		

ERV/CT-ERV			
	Précautions	Jumelage	Commentaires
CTE (Contact ERV)	Aucune	Aucun isolement requis. Un usager identifié CTE peut être jumelé avec un usager qui ne l'est pas.	<p>. Contact étroit : > 24 heures dans la même chambre</p> <p>. Si date du contact < 7 jours: dépistage au jour 0-7-14. Le jour 0 étant la date du «flag»</p> <p>. Si date du contact > 7 jours : un seul dépistage</p>
Positif	«Contact E»	PERMIS, quel que soit le site.	<p>. Dépister chaque mois tant que positif.</p> <p>. Dépister chaque semaine si dernier résultat négatif.</p> <p>. Doit avoir 3 tests négatifs à au moins 7 jours d'intervalle.</p> <p>Un des prélèvements doit être fait sur selles pour cesser l'isolement.</p> <p>**Attendre le résultat du dernier test s'il est en cours dans le but de cesser l'isolement.</p>

Clostridioides difficile			
	Précautions	Jumelage	Commentaires
Recherche ou cas suspecté	«Contact +»	AUCUN	<p><u>(L'isolement devrait être mis en place dès la première selle liquide sans cause apparente, dès la suspicion d'un C. difficile ou dès la réception d'une prescription pour une recherche).</u></p> <p>. Tirer le rideau.</p> <p>. Installer l'affiche de précautions «Contact +» sur le rideau et sur la porte.</p> <p>. Utiliser matériel dédié.</p> <p>. Utiliser les lingettes désinfectantes chlorées de type Clorox ou un produit sporicide pour désinfecter le matériel utilisé</p> <p>N.B : Isolation géographique strictement utilisée en dernier recours, considérer la chambre complète en isolement.</p> <p>Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) et le changer entre chaque usager de la chambre.</p> <p>. Cesser l'isolement si la recherche est négative. Évaluer le besoin d'un isolement gastro avant de cesser tout isolement.</p>
Positif		<p>PERMIS pour deux usagers positifs <u>présentant un tableau clinique similaire</u></p> <p>(Attention si porteur d'autres bactéries multirésistantes, vérifier si jumelage possible selon les BMR).</p>	<p>. Utiliser matériel dédié.</p> <p>. Utiliser les lingettes désinfectantes chlorées de type Clorox.</p> <p>Aucun isolement requis pour les usagers ayant partagé la chambre avec un usager testé positif.</p>

Tableau résumé des multigermes en prévention des infections - HSCO

Tuberculose			
	Précautions	Jumelage	Commentaires
Recherche ou suspicion	«Aériennes» (Pression négative)	AUCUN	. Chambres 243, 244, 341, 342 . <u>L'isolement ne peut être cessé que par le médecin traitant ou la microbiologie.</u> En accord avec le SPCI
Positif		AUCUN	. L'isolement ne peut être cessé que par le médecin traitant ou la microbiologie. En accord avec le SPCI

Bacille Gram négatif multirésistant (BGNMR)			
	Précautions	Jumelage	Commentaires
Positif	«Contact»	AUCUN	. Ne peut être jumelé en aucun temps . Cocher la nature et le site du spécimen et selon le dépistage nécessaire, cocher BGNMR dans la section «Bactériologie» . Ne pas cocher «culture aérobie» sans prescription médicale. . 3 prélèvements à 7 jours d'intervalle, sans ATB pour cesser l'isolement, après validation par SPCI.
	«Contact et Gouttelettes» si positif dans les expectorations		

Gastro-Entérite d'allure virale (GEV)			
	Précautions	Jumelage	Commentaires
Positif ou tableau clinique de GEV	«Contact et Gouttelettes»	AUCUN, mais maintenir l'usager asymptomatique avec le cas suspect dans la même chambre.	. Tirer le rideau. . Installer l'affiche sur le rideau et la porte. . Utiliser du matériel et une toilette dédiée . Maintien des précautions additionnelles ad 48 heures post-fin des symptômes de GEV. Le suivi est assuré par les conseillères du SPCI.
N.B : Considérer la chambre complète en isolement. Porter l'équipement de protection individuelle (ÉPI) et le changer entre chaque usager. Les voisins qui ne sont pas symptomatiques peuvent circuler sans EPI s'ils procèdent à l'hygiène des mains avant de sortir de la chambre.			

ZONA/Varicelle			
	Précautions	Jumelage	Commentaires
Localisé	«Aucune» ou «Contact»	AUCUN	. La transmission se fait par contact direct ou indirect. . Recouvrir la zone touchée par un pansement sec. Aucune précaution si zone couverte. . Dans le cas où le pansement n'absorbe pas tout l'exsudat des lésions, mettre en précautions de «Contact».
Localisé (hôte immunovulnérable)	«Aériennes et Contact» (pression négative)	AUCUN	. Après 24 heures de traitement antiviral, suivre les recommandations pour un zona localisé chez un hôte normal.
Disséminé ou varicelle		AUCUN	. Dès qu'il y a la mention dans les notes médicales que le zona est disséminé, il faut mettre l'usager dans une chambre à pression négative, chambres 243, 244, 341, 342. Une évaluation médicale en collaboration avec la conseillère en prévention des infections est souhaitable.

Tableau résumé des multigermes en prévention des infections - HSCO

Influenza/VRS			
	Précautions	Jumelage	Commentaires
Recherche	« Contact et Gouttelettes »	AUCUN Transférer le voisin de chambre qui est asymptomatique (s'il était dans la chambre depuis moins de 24h). Ne pas jumeler ad résultat de l'influenza et du VRS.	<ul style="list-style-type: none"> . Si le résultat est négatif, l'isolement peut être cessé sauf si le médecin désire le maintenir. . S'assurer qu'aucun panel respiratoire (multiplex) soit en cours avant de cesser l'isolement.
Positif		PERMIS Même souche à moins de 48 heures d'intervalle entre les prélèvements. Influenza A avec A Influenza B avec B VRS avec VRS (Attention si porteur d'autres bactéries multirésistantes vérifier si jumelage possible selon les BMR).	<p><u>Durée d'isolement :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> . Maintenir isolement en place pour un minimum de 5 jours après le début des symptômes. . Si usager symptomatique mais recherche d'Influenza négative, maintenir isolement pendant 5 jours. <p>**Ne pas cesser l'isolement sans l'avis du SPCI ou du médecin traitant **</p>
N.B : Considérer la chambre complète en isolement. Porter l'équipement de protection individuelle (ÉPI) et le changer entre chaque usager.			

BGNPC/CT-BGNPC			
	Précautions	Jumelage	Commentaires
CT-BGNPC	« Contact E »	PERMIS pour les usagers identifiés " Contact élargi " Pas de jumelage pour les usagers hospitalisés hors Canada.	<ul style="list-style-type: none"> . Aucune surveillance à la porte n'est requise. . Dépistage au jour 0, 7, et 14 <u>Un des prélèvements doit être fait sur selles, pour cesser l'isolement.</u>
		PERMIS pour les usagers identifiés " Contact étroit " ayant le même gène de résistance	N. B. : Les usagers provenant d'une installation en éclosion de BGNPC ou hospitalisés hors Québec sont considérés comme des "contacts élargis".
TIC négatif		AUCUN Isoler seul	Aucune surveillance à la porte. Attente du rapport final confirmant le résultat négatif.
Confirmé BGNPC ou suspecté TIC positif		PERMIS , uniquement pour les usagers ayant le même gène de résistance. Ex. KPC avec KPC Transférer l'usager dans la cohorte, si possible	<ul style="list-style-type: none"> . Surveillance 24/24 à la porte effectuée par une personne dédiée en permanence et registre BGNPC à compléter. . À moins d'exception, l'unité dédiée à la cohorte de BGNPC est l'unité du 3C . Dépister chaque 3 mois tant que positif. . Dépister chaque semaine si dernier résultat négatif. . Doit avoir 3 tests négatifs pour chaque site connu BGNPC, minimum 7 jours d'intervalle. Un des prélèvements doit être fait sur selles, pour cesser l'isolement.
EX-BGNPC	Aucune	PERMIS	<ul style="list-style-type: none"> . Dépistage x 1 à l'admission et lors des dépistages d'unité
* Consulter l'algorithme disponible sur le site intranet : «Soins et services», «Services professionnels», «Prévention des infections», «Outils cliniques»			

Tableau résumé des multigermes en prévention des infections - HSCO

Punaises			
	Précautions	Jumelage	Commentaires
Présence suspectée (usager connu pour des punaises à la maison mais parasite non vu à l'HSCO)	«Contact» ou «Aucune»	AUCUN	<ul style="list-style-type: none"> . Mettre l'usager en précautions contact. . Retirer les effets personnels et les mettre dans un sac plastique doublé. Inscrire le nom de l'usager, ses coordonnées, le numéro de chambre, l'unité, la date et l'heure sur le sac. . Déposer le sac dans le congélateur pour une durée de 72hres minimum. (Contacter la sécurité pour ouverture du local). . Faire prendre une douche à l'usager et lui faire revêtir une jaquette propre. S'assurer qu'il se soit lavé les cheveux. . Une fois que l'usager a pris sa douche, qu'il revêt une jaquette propre et qu'il se trouve dans un espace non contaminé, avec literie propre, l'isolement peut être cessé. . Au moins une punaise doit avoir été vue pour qu'il y ait une indication de traiter l'environnement. Se référer au Service d'hygiène-salubrité pour le protocole en vigueur. . Demander aux visiteurs ou à la famille de rapporter le sac d'effets personnels. . Un feuillet explicatif peut être remis à l'usager / famille. Il est disponible sur le site intranet du Service de prévention des infections : «Soins et services», «Services professionnels», «Prévention des infections», «Éducation et formation»
Présence confirmée (parasite vu)			
* Consulter l'algorithme disponible sur le site intranet : «Soins et services», «Services professionnels», «Prévention des infections», «Outils cliniques»			

SARS-CoV-2 (COVID-19)			
	Précautions	Jumelage	Commentaires
Usager en dépistage (asx) «Dépistage administratif»	Aucune	PERMIS Prélèvement fait pour admission à l'unité de soins Jumelé avec un usager sans isolement. (** Attention si porteur d'autres bactéries multirésistantes se référer aux cohortages selon les BMR)	<ul style="list-style-type: none"> . Prélèvement administratif chez tous les usagers pour qui une demande d'admission est faite. Le dépistage pour la COVID-19 devra être effectué à tous les usagers ayant une demande d'admission. Si positif, poursuivre selon les règles établies. . Les usagers asymptomatiques qui ont un antécédent de COVID-19 depuis < 2 mois n'ont pas besoin de dépistage administratif. . Cas qui présente des symptômes compatibles avec la Covid-19 qui est à risque de subir ou pour qui une IMGA est en cours. . Le SPCI se réserve le droit de laisser un usager sous précautions additionnelles au besoin.
Usager en recherche (sx) avec IMGA	«Aérienne et Contact avec protection oculaire» MRSI (Chambre pression négative. Si non disponible, chambre régulière, porte fermée avec N-95)	AUCUN	

Tableau résumé des multigermes en prévention des infections - HSCO

SARS-CoV-2 (COVID-19)			
	Précautions	Jumelage	Commentaires
Contact-Covid (CT-COVID) avec IMGA	«Aérienne et contact avec protection oculaire» MRSI	AUCUN Permis seulement avec un EX-COVID	<p>. Usager ayant eu un contact étroit avec un cas positif confirmé ou usager provenant d'un milieu en éclosion et qui est à risque de subir ou pour qui une IMGA est en cours.</p> <p>. La durée des précautions est au minimum de 7 jours suivant le dernier contact avec le cas positif.</p>
Positif COVID-19 avec IMGA	(Chambre pression négative. Si non disponible, chambre régulière, porte fermée avec N-95)	<p style="text-align: center;">PERMIS, pour les usagers positifs avec les mêmes précautions additionnelles</p> <p>(Attention si porteur d'autres bactéries multirésistantes se référer aux cohortages selon les BMR)</p>	<p>. Cas COVID-19 positif qui est à risque de subir ou pour qui une IMGA est en cours.</p> <p>. La durée des précautions sera évaluée par l'équipe médicale en collaboration avec le SPCI en fonction de la condition clinique de l'usager.</p> <p>. Déplacer l'usager sur les unités ciblées (cohortes) pour les cas confirmés COVID-19 ou suivre les directives en vigueur.</p>

Cette section est en lien avec la directive de la CNESST quant au port du masque N95			
Usager en recherche (sx) sans IMGA	«Aérienne et Contact avec protection oculaire»	AUCUN	<p>. Cas qui présente des symptômes compatibles avec la Covid-19 et chez qui il n'y a pas d'IMGA.</p> <p>Le SPCI se réserve le droit de laisser un usager sous précautions additionnelles au besoin.</p>
Contact-Covid (CT-COVID) sans IMGA		<p style="background-color: yellow;">PERMIS</p> <p style="background-color: yellow;">Seulement avec un usager identifié EX-COVID</p>	<p>. Usager ayant eu un contact étroit avec un cas positif confirmé (Ct- étroit) ou ou . Usager provenant d'un lieu en éclosion (Ct élargi). ou . Usager ayant reçu des soins à moins de 2 mètres pendant 10 minutes ou plus par un TdS confirmé de COVID-19 qui ne portait pas adéquatement son masque pendant sa période de contagiosité Une surveillance étroite de l'apparition éventuelle de symptômes est requise. En cas d'apparition de symptômes : effectuer un prélèvement pour COVID-19.</p> <p>.Prélever l'usager au Jour 1, Jour 4 et Jour 6 post dernier contact avec un usager testé positif.</p> <p>La durée des précautions est au minimum de 7 jours suivants le dernier contact avec le cas positif si asymptomatique et si résultats négatifs.</p>
Positif COVID-19 sans IMGA		<p style="text-align: center;">PERMIS, pour les usagers positifs avec les mêmes précautions additionnelles</p> <p>(Attention si porteur d'autres bactéries multirésistantes se référer aux cohortages selon les BMR)</p>	<p>. Déplacer l'usager sur les unités ciblées pour les cas confirmés COVID-19 (cohortes) ou suivre les directives en vigueur.</p> <p><u>La durée des précautions sera évaluée par l'équipe médicale en collaboration avec le SPCI en fonction de la condition clinique de l'usager.</u></p>
Ex-COVID	Aucune	<p style="text-align: center;">PERMIS</p> <p style="background-color: yellow;">Jumelage possible avec les CT-COVID ou les usagers sans isolement</p>	<p>. Jumelage: un usager considéré comme Ex-COVID peut être jumelé avec un usager naïf à la covid ou avec un usager CT-COVID, après avoir vérifié que:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'usager ex-covid est toujours dans sa période de 2 mois post-infection • le CT-COVID est <7 jours <p>Si l'usager présente des symptômes compatibles avec la COVID-19, mettre l'usager en isolement pendant la durée de l'investigation clinique.</p>

Tableau résumé des multigermes en prévention des infections - HSCO

Candida auris/CT-auris			
	Précautions	Jumelage	Commentaires
CT-AURIS élargi (Contact AURIS élargi)	Contact +	AUCUN: isoler seul	<ul style="list-style-type: none"> . Usager hospitalisé dans la dernière année ou transféré directement d'un autre CH avec histoire d'éclosion. . Usager ayant reçu des soins dans la dernière année ou transféré directement d'une installation hors Québec. . Usager ayant séjourné 24 heures ou plus sur la même unité qu'un cas (colonisé ou infecté) ou qui a partagé les mêmes travailleurs de la santé. . Dépister 1x/semaine jusqu'à 3 résultats négatifs à 7 jours d'intervalle pour cesser l'isolement, après validation du SPCI. Prélèvement au niveau des 2 narines, 2 aisselles et 2 aines <u>avec un seul écouvillon dans cet ordre.</u>
CT-AURIS étroit (Contact AURIS étroit)		AUCUN: isoler seul	<ul style="list-style-type: none"> . Usager qui a partagé la même chambre plus de 4 heures ou qui a partagé la même toilette qu'un usager positif. . Usager hébergé dans la même chambre qu'un cas positif, même si celui-ci a déjà pris congé et que la chambre n'a pas été partagée avec lui, peu importe le type de désinfection effectuée. . Prélèvement au niveau des 2 narines, 2 aisselles et 2 aines <u>avec un seul écouvillon dans cet ordre.</u>
Candida auris Positif		AUCUN: isoler seul	<ul style="list-style-type: none"> . Pour une hospitalisation < 3 mois: Appliquer les précautions additionnelles pour la durée de l'hospitalisation. . Pour une hospitalisation > 3 mois: Dépister après 3 mois au niveau des 2 narines, des 2 aisselles et des 2 aines. . Si résultat positif: Dépister dans 3 mois et maintenir les précautions additionnelles . Si résultat négatif: Dépister 1x/semaine jusqu'à 3 résultats négatifs à 7 jours d'intervalle pour cesser l'isolement, après validation du SPCI. Par la suite, un dépistage hebdomadaire sera poursuivi jusqu'au départ de l'usager. . Un résultat négatif est considéré comme valide uniquement en l'absence de traitement antifongique depuis au moins 7 jours. Il est recommandé d'attendre 48 heures avant de prélever sur un site qui a été désinfecté avec un antiseptique topique (ex: chlorhexidine). . Dépistage hebdomadaire des unités où séjourne un usager porteur jusqu'à minimum 4 semaines après son départ. . Isolement seul avec matériels et toilettes dédiés. Utiliser les lingettes chlorées pour la désinfection des petits équipements et matériels utilisés. . Désinfection quotidienne de la chambre avec un produit sporicide et au départ de l'usager.

Tableau résumé des multigermes en prévention des infections - HSCO

Variole simienne		
Précautions	Jumelage	Commentaires
<p>Contact variole simienne (CT variole simienne)</p>	<p>PERMIS</p>	<p>.Usager qui a eu un contact de la peau ou muqueuses avec des lésions, liquides biologiques, objets, surfaces, matériels contaminés. La transmission se fait par contact direct et indirect.</p> <p>. Usager qui a eu un contact par exposition lors d'une IMGA sans N95.</p> <p>. Usager qui a eu un contact suite à un séjour de 3 heures et plus dans la même chambre qu'un cas positif sans précautions additionnelles.</p> <p>. Pas d'isolement tant qu'asymptomatique. Mise en place des précautions MRSI dès l'apparition de symptômes.</p> <p>. La surveillance des symptômes inclut le suivi de l'apparition de fièvre, de ganglions enflés, de lésions cutanées, de douleurs musculaires, de céphalées, de fatigue et de sueurs nocturnes.</p> <p>. Usager ayant partagé la même chambre jusqu'à l'obtention du résultat de l'usager symptomatique: faire inscrire "CT Variole simienne" dans la bande jaune du tableau des lits. L'isolement sera cessé si le résultat de l'usager symptomatique est négatif et que le médecin a éliminé toute suspicion de variole simienne.</p>
<p>Recherche ou suspicion</p>	<p>AUCUN</p>	<p>. Faire inscrire la nécessité médicale "IS" au tableau des lits pour indiquer que l'usager est en recherche symptomatique pour la variole simienne (avec notification additionnelle dans le bandeau jaune).</p>
<p>Usager confirmé</p>	<p>AUCUN</p>	<p>. Les soirs, nuits, FDS: faire inscrire "IS" " variole simienne" Dans le tableau des lits, l'alerte sera ajoutée le jour ouvrable suivant.</p> <p>. Surveillance des symptômes, des lésions. Faire porter un masque à l'usager et couvrir les lésions, si possible.</p> <p>. Application des précautions additionnelles jusqu'à perte des croûtes et renouvellement de la peau. Une évaluation médicale en collaboration avec la conseillère en prévention des infections est souhaitable pour cesser l'isolement.</p> <p>. Aucun temps d'attente pour les changements d'air n'est requis entre deux usagers. Procéder à un nettoyage et une désinfection de la chambre en mode "variole simienne "avant d'installer un nouvel usager dans la pièce, changer les rideaux.</p> <p>. Nettoyage des matériels de soins et équipements avec produit virucide.</p> <p>. Manipuler soigneusement le linge et la literie souillée, en évitant de secouer la literie. Placer le linge dans un sac étanche (scellé ou attaché et placé à l'intérieur d'un sac imperméable) ou doublé pour le transport vers la buanderie.</p>