

Tableau résumé des multigermes en prévention des infections - HMR

| SARM | | | |
|---------|--|--|---|
| | Précautions | Jumelage | Commentaires |
| Positif | «Contact» | PERMIS quel que soit le(s) site(s) ou la Clinda (R et S) | . À l'admission d'un usager connu porteur SARM et pour les contacts étroits (>24heures dans la même chambre): dépister le nez, les plaies présentant un écoulement, pourtour de stomie et l'urine chez les usagers porteurs d'une sonde . Ne pas isoler les contacts étroits en cours de dépistage. . Requiert 3 prélèvements pour chaque site connu à 7 jours d'intervalle sans ATB (anti-SARM tel que vancomycine iv, etc.) pour cesser l'alerte au dossier. |
| | «Contact et Gouttelettes» si + dans les expectorations | | |

| ERV/CT-ERV | | | |
|---|---|---|--|
| | Précautions | Jumelage | Commentaires |
| CT-ERV (Contact ERV) | Aucune sauf sur les unités de greffes : 5CD, 6A et l'IUHOTC | PERMIS, EXCEPTÉ pour la clientèle de greffés qui ne doit pas être jumelée avec la clientèle non greffée | . Contact étroit : > 24 heures dans la même chambre . Si date du contact < 7 jours: dépistage au jour 0-3-7 . Le jour 0 étant la date du «flag» . Si date du contact > 7 jours : un seul dépistage |
| Positif | «Contact E» | PERMIS Peu importe le site: Jumeler les van A avec les van A Jumeler les van B avec les van B Jumeler les van AB avec les van AB Ne pas jumeler si le van est non disponible Ne pas jumeler les van douteux (van ?) | . Dépister chaque mois tant que positif . Dépister chaque semaine si dernier résultat négatif . Doit avoir 3 tests négatifs, minimum 7 jours d'intervalle Un des prélèvements doit être fait sur selles, pour cesser l'isolement. *Ne pas jumeler les usagers dont le dernier dépistage est en cours afin de cesser l'isolement |
| * Van = gène de résistance, disponible sur le rapport de l'ERV* | | | |

| Bacille Gram négatif multirésistant (BGNMR) | | | |
|---|--|--------------------|--|
| | Précautions | Jumelage | Commentaires |
| Positif | «Contact» | AUCUN: isoler seul | . Ne peut être jumelé en aucun temps . Cocher la nature et le site du spécimen et selon le dépistage nécessaire, cocher BGNMR dans la section «Bactériologie» . Ne pas cocher «culture aérobie» sans prescription médicale. . 3 prélèvements à 7 jours d'intervalle, sans ATB pour cesser l'isolement, après validation par SPCI. |
| | «Contact et Gouttelettes» si + dans les expectorations | | |

| Bêta-lactamase à spectre étendu (BLSE) | | | |
|--|--|---|---|
| | Précautions | Jumelage | Commentaires |
| Positif | «Contact» | PERMIS quel que soit le(s) site(s) et le germe. | . Cocher la nature et le site du spécimen et selon le dépistage nécessaire, cocher BLSE dans la section Bactériologie . <u>Ne pas cocher «culture aérobie»</u> sans prescription médicale. . 3 prélèvements pour chaque site connu à 7 jours d'intervalle sans ATB. |
| | «Contact et Gouttelettes» si + dans les expectorations | | |

Tableau résumé des multigerms en prévention des infections - HMR

| <i>Clostridioides difficile</i> | | | |
|--|-------------|--|---|
| | Précautions | Jumelage | Commentaires |
| Usager suspecté (Test rapide) | «Contact +» | AUCUN Si déjà jumelé attendre résultat du test rapide Ne pas jumeler ad résultat | <p><u>(L'isolement devrait être mis en place dès la première selle liquide sans cause apparente, dès la suspicion d'un <i>C.difficile</i> ou dès la réception d'une prescription pour une recherche de <i>C.difficile</i>)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> . Tirer le rideau . Installer l'affiche sur le rideau et sur la porte . Utiliser du matériel et une toilette dédiés . Utiliser les lingettes désinfectantes chlorées de type Clorox ou un produit sporicide pour désinfecter le matériel utilisé. <p>N.B. Isolement géographique strictement utilisée en dernier recours, considérer la chambre complète en isolement. Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) et le changer entre chaque usager de la chambre.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Cesser l'isolement si la recherche est négative. Évaluer le besoin d'un isolement gastro avant de cesser tout isolement. |
| Usager suspecté Test dont la PCR est en cours | | AUCUN Séparer les usagers lorsqu'un d'entre eux est en recherche. | |
| Positif | | PERMIS pour 2 usagers positifs <u>présentant un tableau clinique similaire</u> (Attention si porteur d'autres bactéries multirésistantes, se référer aux jumelages selon les BMR) | |

| BGNPC/CT-BGNPC/EX-BGNPC | | | |
|---|-------------|---|--|
| | Précautions | Jumelage | Commentaires |
| CT-BGNPC | «Contact E» | PERMIS pour les usagers identifiés " contacts élargis " Pas de jumelage pour les usagers hospitalisés hors Canada. | <ul style="list-style-type: none"> . Aucune surveillance à la porte n'est requise. . Dépistage au jour 0, 7, et 14 <p><u>Un des prélèvements doit être fait sur selles, pour cesser l'isolement.</u></p> |
| TIC négatif | | AUCUN | Aucune surveillance à la porte n'est requise. Attente du rapport final confirmant le résultat négatif. |
| Confirmé BGNPC ou suspecté ou TIC positif | | AUCUN | <ul style="list-style-type: none"> . Surveillance 24/24 à la porte effectuée par une personne dédiée en permanence et registre BGNPC à compléter. . À moins d'exception, l'unité dédiée à la cohorte de BGNPC est l'unité du 10AB. . Dépister chaque 3 mois tant que positif. . Dépister chaque semaine si dernier résultat négatif. . Doit avoir 3 tests négatifs pour chaque site connu BGNPC, minimum 7 jours d'intervalle. <p><u>Un des prélèvements doit être fait sur selles, pour cesser l'isolement.</u></p> |
| EX-BGNPC | Aucune | Permis | <ul style="list-style-type: none"> . Dépistage x 1 à l'admission et lors des dépistages d'unité |

Consulter l'algorithme disponible sur le site intranet : «Soins et services», «Services professionnels», «Prévention des infections», «Outils cliniques»

Tableau résumé des multigerms en prévention des infections - HMR

| Gastro-Entérite d'allure virale (GEV) | | | |
|--|---------------------------|--|---|
| | Précautions | Jumelage | Commentaires |
| Positif ou tableau clinique de GEV | «Contact et Gouttelettes» | AUCUN, mais maintenir l'usager asymptomatique avec le cas suspect dans la même chambre | <ul style="list-style-type: none"> . Tirer le rideau . Installer l'affiche sur le rideau et la porte . Utiliser du matériel et une toilette dédiée . Maintien des précautions additionnelles ad 48 heures post fin des symptômes de GEV. . Prélèvement de contrôle nécessaire chez les patients immunovulnérables pour cesser l'isolement. Le suivi est assuré par les conseillères du SPCI. |
| N.B. Considérer la chambre complète en isolement. Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) et le changer entre chaque usager. Les voisins qui ne sont pas symptomatiques peuvent circuler sans EPI s'il procède à l'hygiène des mains avant de sortir de la chambre. Seules les unités en éclosions de GEV ou la clientèle d'hématologie/greffe de moelle osseuse peuvent procéder au prélèvement de la GEV. | | | |

| Influenza/RSV | | | |
|---------------|---------------------------|---|--|
| | Précautions | Jumelage | Commentaires |
| Recherche | «Contact et Gouttelettes» | AUCUN Transférer le voisin de chambre qui est asymptomatique (s'il était dans la chambre depuis moins de 24h). Ne pas jumeler ad résultat de l'influenza et du VRS. | <ul style="list-style-type: none"> . Si le résultat est négatif, l'isolement peut être cessé sauf si le médecin désire le maintenir. . S'assurer qu'aucun panel respiratoire ne soit en cours avant de cesser l'isolement. |
| Positif | | PERMIS Même souche à moins de 48 heures d'intervalle entre les prélèvements Influenza A avec A Influenza B avec influenza B RSV avec RSV... (Attention si porteur d'autres bactéries multirésistantes se référer aux cohortages selon les BMR) | Durée d'isolement: <ul style="list-style-type: none"> . Positif non immunosupprimé avec traitement: isolement peut être cessé 5 jours après le début du traitement si état clinique amélioré . Positif immunosupprimé: ad congé . Positif sans traitement: Selon SPCI . Usagers des SI ou Unité coro: ad 1 résultat négatif Pédiatrie: ad congé **Ne pas cesser l'isolement sans l'avis du SPCI ou du médecin traitant ** |

| Tuberculose | | | |
|------------------------|------------------------------------|----------|--|
| | Précautions | Jumelage | Commentaires |
| Recherche ou suspicion | «Aériennes» (Pression négative) | AUCUN | <ul style="list-style-type: none"> . Chambre à pression négative pour tout usager suspecté. . <u>L'isolement ne peut être cessé que par le médecin traitant ou la microbiologie.</u> En accord avec le SPCI |
| Positif | | AUCUN | <ul style="list-style-type: none"> . <u>L'isolement ne peut être cessé que par le médecin traitant ou la microbiologie.</u> En accord avec le SPCI |

Tableau résumé des multigermes en prévention des infections - HMR

| ZONA/Varicelle | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| | Précautions | Jumelage | Commentaires |
| Localisé (hôte normal) | «Aucune» ou «Contact» | AUCUN | <ul style="list-style-type: none"> . La transmission se fait par contact direct ou indirect. . Recouvrir la zone touchée par un pansement sec. Aucune précaution si zone couverte. . Dans le cas où les lésions présentent beaucoup d'écoulement et qu'il est difficile de les recouvrir adéquatement, mettre en précautions «Contact» |
| Localisé (hôte immunovulnérable) | «Aériennes et Contact» (pression négative) | AUCUN | <ul style="list-style-type: none"> . Après 24 heures de traitement antiviral, suivre les recommandations pour un zona localisé chez un hôte normal. |
| Disséminé ou varicelle | | AUCUN Ne pas admettre sur l'unité de greffe rénale (6A), au 5CD et à l'IUHOTC | <ul style="list-style-type: none"> . Dès la mention, dans les notes médicales, que le zona est disséminé, il faut mettre l'utilisateur dans une chambre avec pression négative. Ceci peut parfois être impossible pour certaines clientèles telles que la clientèle de GMO. Une évaluation médicale en collaboration avec la conseillère en prévention des infections est souhaitable. |

| Punaises | | | |
|--|-----------------------|----------|--|
| | Précautions | Jumelage | Commentaires |
| Présence suspectée (usager connu pour des punaises à la maison, mais parasite non vu à HMR) | «Contact» ou «Aucune» | AUCUN | <ul style="list-style-type: none"> . Mettre l'utilisateur en précaution de contact. . Retirer les effets personnels et les mettre dans un sac plastique fermé, doublé. <u>Inscrire le nom de l'utilisateur, ses coordonnées, le numéro de chambre, l'unité, la date et l'heure sur le sac.</u> Pour la literie, utiliser un sac blanc à literie souillée. . Pour les <u>unités de soins</u>, contacter l'hygiène-salubrité pour le dépôt du sac dans les congélateurs prévus à cet effet. . Pour l'urgence, utiliser les congélateurs de l'unité se trouvant au sous-sol. Le sac doit demeurer au congélateur pour une durée de > 72h. |
| Présence confirmée (parasite vu) | | | <ul style="list-style-type: none"> . Faire prendre une douche à l'utilisateur et lui faire revêtir une jaquette propre. S'assurer qu'il se soit lavé les cheveux. . Soit faire faire la grande désinfection de la chambre incluant la literie au complet ou changer l'utilisateur de chambre. Une fois le nettoyage / désinfection faite, aucun isolement n'est requis. . Au moins une punaise doit avoir été vue pour qu'il y ait une indication de traiter l'environnement. <u>Se référer au Service d'hygiène-salubrité pour le protocole en vigueur.</u> . Demander aux visiteurs ou à la famille de rapporter le sac d'effets personnels. . Un feuillet explicatif peut être remis à l'utilisateur / famille. Il est disponible sur le site intranet du Service de prévention des infections : «Soins et services», «Services professionnels», «Prévention des infections», «Éducation et formation». |

Tableau résumé des multigermes en prévention des infections - HMR

| SARS-CoV-2 (COVID-19) | | | |
|---|--|---|---|
| | Précautions | Jumelage | Commentaires |
| Usager en dépistage (asx) «Dépistage administratif» | Aucune | <p>PERMIS avec un usager sans isolement.</p> <p>(Attention si porteur d'autres bactéries multirésistantes se référer aux cohortages selon les BMR)</p> | <p>. Prélèvement administratif à J1 et J4 de l'admission chez tous les usagers asymptomatiques pour qui une demande d'admission est faite</p> <p>. Le dépistage pour la COVID-19 devra être effectué à tous les usagers ayant une demande d'admission. Si positif, poursuivre selon les règles établies.</p> <p>. Les usagers asymptomatiques qui ont un antécédent de COVID-19 depuis < 2 mois n'ont pas besoin de dépistage administratif.</p> |
| Usager en recherche (sx) avec IMGA | <p>MRSI «Aérienne et Contact avec protection oculaire»</p> <p>(Chambre pression négative. Si non disponible, chambre régulière, porte fermée avec N-95)</p> | AUCUN | <p>. Cas qui présente des symptômes compatibles avec la Covid-19 qui est à risque de subir ou pour qui une IMGA est en cours.</p> <p>. Le SPCI se réserve le droit de laisser un usager sous précautions additionnelles au besoin.</p> |
| Contact-Covid (CT-COVID) avec IMGA | | <p>AUCUN Permis seulement avec les EX-COVID</p> | <p>. Usager ayant eu un contact étroit avec un cas positif confirmé ou usager provenant d'un milieu en éclosion et qui est à risque de subir ou pour qui une IMGA est en cours.</p> <p>. Prélever l'usager au Jour 1, Jour 4 et Jour 6 post dernier contact avec un usager testé positif.</p> <p><u>La durée des précautions est au minimum de 7 jours suivant le dernier contact avec le cas positif.</u></p> |
| Usager COVID-19 positif avec IMGA | | <p>PERMIS, pour les usagers positifs avec les mêmes précautions additionnelles</p> <p>(Attention si porteur d'autres bactéries multirésistantes se référer aux cohortages selon les BMR)</p> | <p>. Cas COVID-19 positif qui est à risque de subir ou pour qui une IMGA est en cours.</p> <p>. La durée des précautions sera évaluée par l'équipe médicale en collaboration avec le SPCI en fonction de la condition clinique de l'usager.</p> <p>. Déplacer l'usager sur les unités ciblées (cohortes) pour les cas confirmés COVID-19 ou suivre les directives en vigueur.</p> |

Tableau résumé des multigermes en prévention des infections - HMR

| SARS-CoV-2 (COVID-19) | | | |
|--|---|---|--|
| Cette section est en lien avec la directive de la CNESST quant au port du masque N95 | | | |
| Usager en recherche (sx) sans IMGA | «Aérienne et Contact avec protection oculaire» | AUCUN | <ul style="list-style-type: none"> . Cas qui présente des symptômes compatibles avec la Covid-19 et chez qui il n'y a pas d'IMGA. . Le SPCI se réserve le droit de laisser un usager sous précautions additionnelles au besoin. |
| Contact-Covid (CT-COVID) sans IMGA | | PERMIS Seulement avec les EX-COVID | <ul style="list-style-type: none"> . Usager ayant eu un contact étroit avec un cas positif confirmé (Ct- étroit) ou OU . Usager provenant d'un lieu en éclosion (Ct élargi). OU . Usager ayant reçu des soins à moins de 2 mètres pendant 10 minutes ou plus par un TdS confirmé de COVID-19 qui ne portait pas adéquatement son masque pendant sa période de contagiosité <p>Une surveillance étroite de l'apparition éventuelle de symptômes est requise. En cas d'apparition de symptômes : effectuer un prélèvement pour COVID-19.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Prélever l'usager au Jour 1, Jour 4 et Jour 6 post dernier contact avec un usager testé positif. <p><u>La durée des précautions est au minimum de 7 jours suivants le dernier contact avec le cas positif si asymptomatique et si résultats négatifs.</u></p> |
| Usager COVID-19 positif sans IMGA | | PERMIS , pour les usagers positifs avec les mêmes précautions additionnelles (Attention si porteur d'autres bactéries multirésistantes se référer aux cohortages selon les BMR) | <ul style="list-style-type: none"> . Déplacer l'usager sur les unités ciblées pour les cas confirmés COVID-19 (cohortes) ou suivre les directives en vigueur. <p><u>La durée des précautions sera évaluée par l'équipe médicale en collaboration avec le SPCI en fonction de la condition clinique de l'usager.</u></p> |
| Ex-COVID | Aucune | PERMIS Jumelage possible avec des CT-COVID ou les usagers sans isolement | <ul style="list-style-type: none"> . Jumelages: un usager considéré comme Ex-COVID peut être jumelé avec un usager naif à la covid ou avec un usager CT-COVID, après avoir vérifié que: <ul style="list-style-type: none"> . l'usager ex-covid est toujours dans sa période de 2 mois post-infection .le Ct-covid est <7 jours <p>Si l'usager présente des symptômes compatibles avec la Covid-19, mettre l'usager en isolement pendant la durée de l'investigation clinique.</p> |
| Consulter la section COVID-19 sur le site intranet : «Soins et services», «Services professionnels», «Prévention des infections», «Mesures et éducation» | | | |

Tableau résumé des multigermes en prévention des infections - HMR

| Candida auris / CT-auris | | | |
|---|-------------|--------------------|--|
| | Précautions | Jumelage | Commentaires |
| CT-AURIS élargi (Contact AURIS élargi) | Contact + | AUCUN: isoler seul | <ul style="list-style-type: none"> . Usager hospitalisé dans la dernière année ou transféré directement d'un autre CH avec histoire d'écllosion. . Usager ayant reçu des soins dans la dernière année ou transféré directement d'une installation hors Québec. . Usager ayant séjourné 24 heures ou plus sur la même unité qu'un cas (colonisé ou infecté) ou qui a partagé les mêmes travailleurs de la santé. . Dépister 1x/semaine jusqu'à 3 résultats négatifs à 7 jours d'intervalle pour cesser l'isolement, après validation du SPCI. Prélèvement au niveau des 2 narines, 2 aisselles et 2 aines <u>avec un seul écouvillon dans cet ordre.</u> |
| CT-AURIS étroit (Contact AURIS étroit) | | AUCUN: isoler seul | <ul style="list-style-type: none"> . Usager qui a partagé la même chambre plus de 4 heures ou qui a partagé la même toilette qu'un usager positif. . Usager hébergé dans la même chambre qu'un cas positif, même si celui-ci a déjà pris congé et que la chambre n'a pas été partagée avec lui, peu importe le type de désinfection effectuée. . Prélèvement au niveau des 2 narines, 2 aisselles et 2 aines <u>avec un seul écouvillon dans cet ordre.</u> |
| Candida auris Positif | | AUCUN: isoler seul | <ul style="list-style-type: none"> . Pour une hospitalisation < 3 mois: Appliquer les précautions additionnelles pour la durée de l'hospitalisation. . Pour une hospitalisation > 3 mois: Dépister après 3 mois au niveau des 2 narines, des 2 aisselles et des 2 aines. . Si résultat positif: Dépister dans 3 mois et maintenir les précautions additionnelles . Si résultat négatif: Dépister 1x/semaine jusqu'à 3 résultats négatifs à 7 jours d'intervalle pour cesser l'isolement, après validation du SPCI. Par la suite, un dépistage hebdomadaire sera poursuivi jusqu'au départ de l'usager. . Un résultat négatif est considéré comme valide uniquement en l'absence de traitement antifongique depuis au moins 7 jours. Il est recommandé d'attendre 48 heures avant de prélever sur un site qui a été désinfecté avec un antiseptique topique (ex: chlorhexidine). . Dépistage hebdomadaire des unités où séjourne un usager porteur jusqu'à minimum 4 semaines après son départ. . Isolement seul avec matériels et toilettes dédiés. Utiliser les lingettes chlorées pour la désinfection des petits équipements et matériels utilisés. . Désinfection quotidienne de la chambre avec un produit sporicide et au départ de l'usager. |

Tableau résumé des multigermes en prévention des infections - HMR

| Variolo simienne | | | |
|--|---|----------|---|
| | Précautions | Jumelage | Commentaires |
| Contact variolo simienne (CT variolo simienne) | Aucune Attention à appliquer les précautions MRSI (avec protection oculaire) si apparition de symptômes | PERMIS | <ul style="list-style-type: none"> . Usager qui a eu un contact de la peau ou muqueuses avec des lésions, liquides biologiques, objets, surfaces, matériels contaminés. La transmission se fait par contact direct et indirect. . Usager qui a eu un contact par exposition lors d'une IMGA sans N95. . Usager qui a eu un contact suite à un séjour de 3 heures et plus dans la même chambre qu'un cas positif sans précautions additionnelles. . Pas d'isolement tant qu'asymptomatique. Mise en place des précautions MRSI dès l'apparition de symptômes. . La surveillance des symptômes inclut le suivi de l'apparition de fièvre, de ganglions enflés, de lésions cutanées, de douleurs musculaires, de céphalées, de fatigue et de sueurs nocturnes. . Usager ayant partagé la même chambre jusqu'à l'obtention du résultat de l'usager symptomatique: faire inscrire "CT Variolo simienne" dans la bande jaune du tableau des lits. L'isolement sera cessé si le résultat de l'usager symptomatique est négatif et que le médecin a éliminé toute suspicion de variolo simienne. |
| Recherche ou suspicion | MRSI (Ch. pression négative. Si non disponible, chambre régulière, porte fermée avec N95 et protection oculaire) | AUCUN | <ul style="list-style-type: none"> . Faire inscrire la nécessité médicale "IS" au tableau des lits pour indiquer que l'usager est en recherche symptomatique pour la variolo simienne (avec notification additionnelle dans la bande jaune). |
| Usager confirmé | | AUCUN | <ul style="list-style-type: none"> . Les soirs, nuits, FDS: faire inscrire "IS" " variolo simienne" Dans le tableau des lits, l'alerte sera ajoutée le jour ouvrable suivant. . Surveillance des symptômes, des lésions. Faire porter un masque à l'usager et couvrir les lésions, si possible. . Application des précautions additionnelles jusqu'à perte des croûtes et renouvellement de la peau. Une évaluation médicale en collaboration avec la conseillère en prévention des infections est souhaitable pour cesser l'isolement. . Aucun temps d'attente pour les changements d'air n'est requis entre deux usagers. Procéder à un nettoyage et une désinfection de la chambre en mode "variolo simienne "avant d'installer un nouvel usager dans la pièce, changer les rideaux. . Nettoyage des matériels de soins et équipements avec produit virucide. . Manipuler soigneusement le linge et la literie souillée, en évitant de secouer la literie. Placer le linge dans un sac étanche (scellé ou attaché et placé à l'intérieur d'un sac imperméable) ou doublé pour le transport vers la buanderie. |