

Consignes d'isolement – Tableau récapitulatif

Précautions additionnelles	Chambre fermée obligatoire	Hygiène des mains obligatoire	Gants obligatoires	Masque obligatoire (chirurgical ou de procédures)	Blouse obligatoire	Bonnet et couvre-chaussures obligatoires	Protection oculaire (visière ou écran facial)
Précautions aériennes							
• Tuberculose • Rougeole	Pression négative	✓		N-95			
Précautions aériennes et contact							
• Varicelle • Zona disséminé ¹	Pression négative	✓	✓	N-95	✓		
Précautions contact							
• Zona localisé (si lésions non couvertes) • SARM • BGNMR	Affiche visible	✓	✓		✓		
• BLSE • Hépatite A • Diarrhées • Gale/poux							
Précautions contact +							
• <i>Clostridioides difficile</i> • Recherche de <i>C. difficile</i>	Affiche visible	Eau et savon	✓		✓		
Précautions contact E							
• ERV • BGNPC • CT-BGNPC	Affiche visible	✓	✓		✓		
• Candida auris • CT-auris							
Précautions contact et gouttelettes							
• Influenza/VRS (Virus Respiratoire Syncytial) • Coronavirus 229E, OC43, HKU1, NL63 • Autres virus respiratoires • Infection invasive au streptocoque du groupe A ² • Méningite à <i>Haemophilus influenzae</i> B ² • SARM/BGNMR/BLSE expectorations • Gastroentérite	Affiche visible	✓	✓	✓	✓		Si risques d'éclaboussures ou toux à l'intérieur de 2 mètres
Précautions gouttelettes							
• Méningite, pneumonie ou septicémie à méningocoque ² • Coqueluche ³ /Rubéole/Oreillons	Affiche visible	✓		✓			Si risques d'éclaboussures ou toux à l'intérieur de 2 mètres
Précautions neutropéniques							
• Greffe de moelle osseuse • Globules blancs neutrophiles < 0,5 x10 ⁹ /L	Pression positive si disponible	✓		✓			
Précautions aériennes et contact avec protection oculaire							
• Usager suspecté ou confirmé COVID-19 sans IMGA	Affiche visible	✓	✓	N-95	✓		✓
Précautions MRSI							
• SRAS/Grippe aviaire/Pandémie • Usager suspecté ou confirmé COVID-19 avec IMGA • Variole simienne	Pression négative	✓	✓	N-95	✓		✓
Précautions fièvre hémorragique virale (Pour la procédure, se référer aux documents en vigueur)							
• Ebola • Marburg • Lassa	Pression négative	✓	✓	N-95	✓	✓	✓

Pour la désinfection, utilisez les produits en vigueur*

*Pour plus d'information se référer aux conseillers et conseillères du Service de prévention et contrôle des infections (SPCI)

1 Une personne ayant déjà eu la varicelle est immune, cependant on doit respecter les précautions de contact afin d'éviter la transmission par les mains contaminées et par l'environnement.

2 Maintenir en précautions jusqu'à 24 heures après le début d'un traitement antibiotique approprié.

3 Maintenir en précautions jusqu'à 3 semaines après le début des symptômes OU jusqu'à 5 jours après le début d'un traitement antibiotique approprié. Vaccin disponible.

AFH-031

Mise à jour : 23 avril 2025

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Est-de-
l'Île-de-Montréal

Québec

