

# Consignes d'isolement – Tableau récapitulatif

Précautions additionnelles	Chambre fermée obligatoire	Hygiène des mains obligatoire	Gants obligatoires	Masque obligatoire (chirurgical ou de procédures)	Blouse obligatoire	Bonnet et couvre-chaussures obligatoires	Protection oculaire (lunettes ou écran facial)	Nombre maximum de visiteurs
<b>Précautions aériennes</b>								
• Tuberculose/Rougeole	Pression négative	✓		N-95				1
<b>Précautions aériennes et contact</b>								
• Varicelle/Zona disséminé <sup>1</sup>	Pression négative	✓	✓	N-95	✓			1
<b>Précautions contact</b>								
• Zona localisé (si lésions non couvertes) • SARM • BGNMR/BLSE • Hépatite A • Diarrhées • Gale/poux	Affiche visible	✓	✓		✓			1
<b>Précautions contact +</b>								
• <i>Clostridioides difficile</i> /Recherche de <i>C. difficile</i> • <i>Candida auris</i>	Affiche visible	Eau et savon	✓		✓			1
<b>Précautions contact E</b>								
• ERV • BGNPC • CT-BGNPC	Affiche visible	✓	✓		✓			1
<b>Précautions contact et gouttelettes</b>								
• Influenza • Infection invasive au streptocoque du groupe A <sup>2</sup> • Méningite à <i>Haemophilus influenzae</i> B <sup>2</sup> • VRS (virus respiratoire syncytial) • SARM/BGNMR/BLSE expectorations • Autres virus respiratoires • Gastroentérite	Affiche visible	✓	✓	✓	✓		Si risques d'éclaboussures ou toux à l'intérieur de 2 mètres	1
<b>Précautions gouttelettes</b>								
• Méningite, pneumonie ou septicémie à méningocoque <sup>2</sup> • Coqueluche <sup>3</sup> /Rubéole/Oreillons	Affiche visible	✓		✓			Si risques d'éclaboussures ou toux à l'intérieur de 2 mètres	
<b>Précautions neutropéniques</b>								
• Greffe de moelle osseuse • Globules blancs neutrophiles < 0,5 x10 <sup>9</sup> /L	Pression positive si disponible	✓	✓	✓	✓			1
<b>Précautions gouttelettes et contact avec protection oculaire</b>								
• Prélèvement administratif pour la COVID-19	Affiche visible	✓	✓	✓	✓		✓	0
<b>Précautions aériennes et contact avec protection oculaire</b>								
• Usager suspecté ou confirmé COVID-19 sans IMGA • Variole simienne	Affiche visible	✓	✓	N-95	✓		✓	0
<b>Précautions MRSI</b>								
• SRAS/Grippe aviaire/Pandémie • Usager suspecté ou confirmé COVID-19 avec IMGA	Pression négative	✓	✓	N-95	✓		✓	0
<b>Précautions spéciales</b>								
• Précautions Ébola selon les recommandations du SPCI								

Pour la désinfection, utilisez les produits en vigueur\*

\*Pour plus d'information se référer aux conseillers et conseillères du Service de prévention et de contrôle des infections (SPCI)

1 Une personne ayant déjà eu la varicelle est immune, cependant on doit respecter les précautions de contact afin d'éviter la transmission par les mains contaminées et par l'environnement.

2 Maintenir en précautions jusqu'à 24 heures après le début d'un traitement antibiotique approprié

3 Maintenir en précautions jusqu'à 3 semaines après le début des symptômes OU jusqu'à 5 jours après le début d'un traitement antibiotique approprié. Vaccin disponible.

CP-AFH-010

Mise à jour: Novembre 2022

Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
de l'Est-de-  
l'île-de-Montréal

Québec

